E-MED ACADEMY

TOKSYNA BOTULINOWA

ZALECENIA PO ZABIEGU:

- przez 4 godziny od zabiegu należy utrzymywać pozycję pionową głowy, nie zaleca się w tym czasie schylania oraz leżenia,
- nie należy podróżować samolotem po zabiegu,
- przez 24 godziny od zabiegu nie zaleca się dotykania, masowania, rozgrzewania w saunie / na solarium / na słońcu obszarów poddawanym iniekcji.

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU:

- ciąża i karmienie piersią,
- aktywny trądzik,
- schorzenia bakteryjne skóry i opryszczka,
- infekcja w proponowanych miejscach wstrzyknięć,
- choroby złącza nerwowego mięśniowego,
- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- miastenia rzekomoporaźna, zespół Eaton Lamberta stwardnienie boczne zanikowe.

Po zabiegu może wystąpić ból głowy, odczyny w miejscu wstrzyknięcia np. rumień, obrzęk, podrażnienie. Pełny efekt osiągany jest po 14 dniach od podania preparatu.

*Zalecenia zostały przygotowane na podstawie ulotki producenta marki Azzalure oraz Botox.

E-MED ACADEMY

LIPOLIZA INIEKCYJNA

ZALECENIA PO ZABIEGU:

- nie nakładać makijażu do 12 godzin w miejscu zabiegowym,
- unikać solarium oraz nadmiernej ekspozycji na słońce do 2 tygodni po zabiegu,
- nie narażać miejsca korekcji na działanie ekstremalnych niskich i wysokich temperatur,
- intensywnie masować miejsce zabiegowe do momentu ustąpienia wyczuwalnych zgrubień,
- nawadniać organizm w celu przyspieszenia drenażu tkanek,
- wszelkie niepokojące zmiany zgłosić niezwłocznie do specjalisty wykonującego zabieg.

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU:

- ciąża i laktacja,
- ostre lub przewlekłe dermatozy i choroby skórne,
- nowotwory, leczenie chemioterapią lub radioterapią,
- ostre choroby nerek i wątroby,
- cukrzyca,
- epilepsja,
- choroby układu immunologicznego,
- choroby krążenia, choroby krwi związane z nadmiernym krwawieniem,
- nieustabilizowane choroby tarczycy,
- alergia lub nadwrażliwością na jakikolwiek składnik preparatu.

Podanie preparatu powoduje powstanie kontrolowanego stanu zapalnego, mogącego objawiać się przejściowym obrzękiem, zaczerwienieniem, zasinieniem i bolesnością tkanek w obszarze iniekcji. W razie nieustąpienia wcześniej wymienionych objawów w ciągu 7 dni należy skontaktować się z ze specjalistą wykonującym zabieg.

*Zalecenia zostały przygotowane na podstawie ulotki producenta marki DIVES. [www]: https://divesmed.pl/.

E-MED ACADEMY

MEZOTERAPIA IGŁOWA

ZALECENIA PO ZABIEGU:

- nie nakładać makijażu do 12 godzin od zabiegu,
- unikać solarium oraz nadmiernej ekspozycji na słońce do 1 tygodnia po zabiegu,
- nie narażać miejsca zabiegowego na działanie ekstremalnych niskich i wysokich temperatur.

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU:

- choroby skórne w miejscu zabiegowym,
- ciąża i laktacja,
- choroba nowotworowa,
- nieustabilizowana cukrzyca,
- epilepsja,
- choroby układu immunologicznego,
- choroby krwi związane z nadmiernym krwawieniem,
- nadwrażliwość lub alergia na jakikolwiek składnik preparatu.

Zabiegi mezoterapii może powodować zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu zabiegowym, które zwykle ustępuje po upływie 24 – 48 godzin.
Przejściowy ból w miejscu iniekcji.
W przypadku reakcji zapalnych trwających tydzień i innych reakcjach niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem.

* Zabiegi mezoterapii igłowej zaleca się wykonywać w seriach. Przed zabiegiem należy ustalić odpowiednią ilość i częstotliwość zabiegów.

*Zalecenia zostały przygotowane na podstawie ulotki producenta marki DIVES. [www]: https://divesmed.pl/, oraz ulotka NCTF 135/HA.

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE
FIBRYNA BOGATOPŁYTKOWA
KOMÓRKI MACIERZYSTE

ZALECENIA PO ZABIEGU:

- Zalecana jest delikatna pielęgnacja skóry,
- unikanie kosmetyków drażniących np. peeling,
- nie zaleca się kosmetyków o silnym działaniu,
- wskazana jest rezygnacja na kilka dni z basenu, sauny, siłowni,
- nie zaleca się wykonywania makijażu przez 12h od zabiegu.

Po zabiegu można wrócić do codziennych aktywności. Możliwe zaczerwienienia, delikatny obrzęk lub zasinienie w okolicy poddawanej zabiegowi.

PRZECIWWSKAZANIA:

- białaczka i szpiczaki,
- choroby krwi, hematofobia,
- choroby nowotworowe,
- schorzenia wątroby,
- ostre zakażenia i stany zapalne, infekcje: bakteryjne, wirusowe, grzybicze.
- zaburzenia układu odpornościowego, ogólny zły stan organizmu,
- choroby autoimmunologiczne,
- choroby wynikające z autoagresji,
- niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)
- antykoagulanty,
- ciąża i karmienie piersią.

*Zalecenia przygotowano na podstawie ulotki produktu: PRP INNMEDIS SYSTEM.

E-MED ACADEMY

WOLUMETRIA TWARZY KWASEM HIALURONOWYM

ZALECENIA PO ZABIEGU:

- unikanie przez kilka dni basenu,
- unikanie sauny oraz solarium,
- nie wskazany jest wysiłek fizyczny przez 72 godziny po zabiegu,
- unikanie promieni słonecznych i stosowanie kremów z filtrem UV,
- nie zaleca się dotykania, masowania obszarów poddanym iniekcji.

PRZECIWWSKAZANIA:

- ciąża i karmienie piersią,
- uczulenie na kwas hialuronowy,
- stany zapalne skóry: trądzik, opryszka
- choroby autoimmunologiczne,
- tendencje do powstawania bliznowców ,
- tendencja do powstawania blizna przerostowych,
- zaburzenia pigmentacji,
- choroba nowotworowa,
- cukrzyca,
- pacjenci poniżej 18 roku życia,
- nie należy stosować u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe lub inhibitory agregacji płytek krwi,
- nie zaleca się stosowania równocześnie z leczeniem laserowym, głębokim peelingiem chemicznym lub dermabrazją.

* Niektóre preparaty posiadają w składzie lidokainę, jeżeli w przeszłości wystąpiła nadwrażliwość na preparat lub miejscowe środki typu amidowego - należy poinformować lekarza przed zabiegiem.

Po zabiegu istnieje możliwość pojawienia się zaczerwienienia, rumienia, zasinienie bolesność okolicy poddanej zabiegowi.

*Zalecenia przygotowano na podstawie ulotki produktów: Princess Filler, Juvederm Voluma.

E-MED ACADEMY

BIOSTYMULATORY

ZALECENIA PO ZABIEGU:

- nie nakładać makijażu do 12 godzin w miejscu zabiegowym,
- unikać solarium oraz nadmiernej ekspozycji na słońce do 2 tygodni po zabiegu,
- nie narażać miejsca korekcji na działanie ekstremalnych niskich i wysokich temperatur.

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU:

- ciąża i okres karmienia piersią,
- aktywne stany zapalne skóry (trądzik, opryszczka),
- uczulenie na składniki preparatu,
- skłonność do występowania blizn przerostowych,
- choroba nowotworowa,
- choroby autoimmunologiczne,
- choroby układu krążenia,
- cukrzyca,
- znana nadwrażliwość na składniki preparatu.

Po zabiegu istnieje możliwość pojawienia się zaczerwienienia, rumienia, bolesność okolicy poddanej zabiegowi.

*Zalecenia zostały przygotowane na podstawie ulotki produktu Pluryal Silk, NUCLEOFILL.